

Description de quelques Buprestides et Cérambycides de la faune malgache

PAR L. FAIRMAIRE.

I. — BUPRESTIDES.

Polybothris Blucheaui n. sp. — Long. 29 mill. — Forme des *P. emarginata* et *nitidiventris*, mais d'une coloration très différente. Tête extrêmement rugueuse et fovéolée, d'un bronzé brillant. Corcelet trapézoïdal, plus étroit que les élytres, fortement rétréci en avant, d'un vert métallique brillant avec quelques teintes légèrement cuivreuses, surface très inégale, parsemée de gros points, avec une impression longitudinale peu profonde et deux impressions obliques, de chaque côté, encore moins marquées, bords latéraux légèrement festonnés. Élytres s'atténuant faiblement au milieu, plus fortement vers l'extrémité, largement déprimées sur les côtés qui sont couverts d'une belle teinte d'un vert satiné avec une étroite bordure marginale d'un bronzé un peu cuivreux, cette teinte verte dépasse presque le milieu du disque, a des lignes de points espacés et devient ruguleuse à l'extrémité, la partie dorsale est d'un bronzé verdâtre brillant avec des stries assez larges, les intervalles convexes, marqués de taches d'un brunâtre métallique et de petites impressions ponctuées; l'extrémité des élytres est un peu roussâtre, tronquée obliquement; le dessous du corps et des pattes est d'un vert métallique avec des taches d'un brunâtre métallique, le milieu de la poitrine et l'abdomen purpurin, ce dernier avec de fortes impressions et des points d'un vert métallique, les métapleures d'un beau violet presque mat et très larges; le métasternum est largement canaliculé.

Farafangana (*Blucheau*). Dédié à M. Blucheau, lazarisite, à qui l'on doit des découvertes fort intéressantes dans le sud-est de Madagascar.

Polybothris Kerremansi n. sp. — Long. 25 mill. — Forme de *P. complanata*, mais plus atténuée en arrière, coloration analogue, plus brillante avec le bord marginal des élytres d'un beau bleu d'azur, le dessous du corps et les pattes d'un bronzé un peu doré très brillant avec des teintes purpurines sur les côtés de l'abdomen dont le dernier segment est entièrement de cette couleur, les pattes sont plus verdâtres; la tête, fortement plissée, présente la même sculpture, ainsi que le corcelet; les élytres sont un peu moins larges et plus atténuées en arrière.

tronquées de même, elles ont aussi 5 ou 6 côtes vers la suture, les externes bien effacées et raccourcies, avec les interstices marqués de gros points plus enfoncés qui forment en dehors des lignes assez régulières et sont plus petits, la marge déprimée est également ruguleuse; en dessous la sculpture est presque indentique, mais le prosternum est très lisse au milieu et les épipleures sont d'un beau bleu.

Farafangana (*Bluchean*).

Polybothris Davidi n. sp. — Long. 25 à 30 mill. — Forme, coloration et sculpture analogues à celles de *P. zivetta*, mais bien plus grand et un peu plus élargi au milieu; la tête et le corselet sont sculptés de même, mais ce dernier est bien plus élargi vers la base dont les angles sont plus aigus, et les côtés sont assez largement bordés de violet; les élytres, plus larges, sont bordées aussi de violet dans leur moitié postérieure, les stries sont bien moins larges, moins profondes, plus finement et plus légèrement ponctuées, les intervalles sont bien moins convexes, surtout en dehors, où les stries deviennent plus vagues avec une ponctuation plus grosse, parfois confluyente et mêlée de rides, les taches, d'un bronzé brunâtre, sont moins nettes et manquent complètement au bord externe qui n'a pas non plus d'impressions, finement et densément ruguleuses, d'un bronzé roussâtre et pubescentes, leur extrémité est tronquée, faiblement bidentée; le dessous est semblable, mais moins verdâtre, le milieu de la poitrine, du 1^{er} segment abdominal, et 4 autres, sont d'un beau bleu d'azur, seulement, sur le prosternum, cette bande est à peine atténuée en avant au lieu d'être fortement rétrécie.

Farafangana (*Bluchean*).

Polybothris purpureiventris n. sp. — Long. 42 mill. — Ressemble beaucoup à un très petit individu de *P. Davidi*, même coloration d'un vert métallique brillant avec des fascies d'un roux foncé presque marron sur la partie interne des élytres, mais sans bordure d'un bleu violet, le bord externe des élytres étant largement couvert d'une teinte verdâtre faiblement bleuâtre, moins brillante, les côtés du corselet ont un étroit liséré cuivreux interrompu, un peu épaissi en avant avec un relief violet en dedans; la tête a une sculpture semblable avec le chaperon échancré en arc; le corselet est un peu plus étroit et un peu plus convexe, plus fortement et rugueusement ponctué, l'impression longitudinale médiane est à peine marquée, non carénée, et s'élargit un peu en fossette à la base, la ponctuation plus fine et plus serrée sur les côtés qui sont assez inégaux; les élytres sont plus étroites, plus

convexes, presque parallèles, rétrécies seulement avant l'extrémité qui n'est pas prolongée et dont la terminaison est plus échancrée, la sculpture est presque semblable, mais plus ruguleuse, les intervalles moins relevés, les premiers interrompus par des impressions plus arrondies; le dessous du corps est presque semblable, mais moins ponctué, le prosternum est profondément bisillonné et relevé au milieu, l'abdomen est purpurin avec des plaques d'un beau violet, parsemé de gros points, la saillie intercoxale est faiblement rebordée.

Farafangana (*Blucheau*).

Polybothris lateripicta n. sp. — Long. 23 mill. — Forme et coloration générale de *P. zivetta*, mais avec les élytres moins prolongées et atténuées en arrière, n'ayant que des traces très effacées, ou même nulles, des bandes foncées transversales et, au contraire, des taches très marquées, très nettes, au nombre de 5 sur le bord marginal, alternées avec 3 impressions couvertes de pubescence d'un blanc sale également nettes, et la base du bord marginal ayant une étroite bande allongée moins nette; le corselet et la tête sont semblables; en dessous la couleur est d'un bronzé verdâtre brillant à reflets d'un doré cuivreux, surtout au milieu, l'abdomen a quelques petites plaques bleues sur les côtés et au milieu, le segment anal est semblable, bleu et lisse à la base, rugueux et verdâtre à l'extrémité; le prosternum est plan et rugueusement ponctué entre les hanches, à peine rétréci en avant, les épipleures sont bien cuivreuses.

Madagascar (ma collection).

Le *P. viriditarsis* lui ressemble sous le rapport des taches marginales, mais il est plus petit, plus étroit, plus convexe, d'une coloration plus sombre, et le dessous est très différent, presque lisse et unicolore.

Polybothris guttulata n. sp. — Long. 21 mill. — Assez semblable à *aeneomaculata* mais bien plus grand, non élargi en arrière et un peu plus convexe; d'un vert bronzé un peu sombre et un peu bleuâtre, plus cuivreux et plus brillant sur les élytres qui sont ornées de fossettes rondes d'un vert métallique clair, un peu bleuâtre, surtout celles du dehors, les bords latéraux des élytres comme ceux du corselet teintés de bleuâtre obscur; tête rugueuse, front ayant 4 impressions avec une petite carène longitudinale; corselet trapézoïdal, peu transversal, atténué de la base en avant, côtés presque droits, surface fortement et assez densément ponctué, rugueuse sur les côtés et en avant, au milieu un sillon peu profond, assez large à la base, s'effaçant en avant,

sur les côtés une assez forte impression longitudinale, finement et densément rugueuse, s'élargissant 3 fois sur les bords mêmes qui sont un peu déprimés; élytres oblongues, rétrécies après le milieu, tronquées-échancrées à l'extrémité avec les angles très brièvement pointus, surface à lignes de gros points formant presque des stries, les intervalles assez convexes, interrompus par des fossettes rondes, marqués de quelques points, un peu plissés à la base et sur les côtés; dessous du corps, épipleures et pattes d'un vert métallique brillant, abdomen d'un violacé purpurin, tacheté de vert doré, prosternum fortement bisilloné, saillie intercoxale un peu carénée au milieu, quelques gros points épars sur l'abdomen, plus serrés sur les côtés de la poitrine.

Farafangana (*Bluchea*).

Polybothris indigna n. sp. — Long. 14 mill. — *Oblonga, postice attenuata, parum convexa, obscure cupreola, parum nitida, elytris vitta lata marginali impressa magis metallica, sat dense griseo-pilosula; capite laeve ac grosse punctato, plicatulo, inter antennas impresso, clypeo arcuatim sinuato, antennis brevibus, prothoracis medium vix superantibus, fuscis, opacis, articulis 3 primis aeneis, nitidis; prothorace transverso, elytris parum angustiore, antice a medio leviter angustato, dorso plicatulo-punctato, medio obsolete longitudinaliter impresso; scutello minuto, depresso; elytris oblongis, fere a medio attenuatis, leviter striatulo-punctatis, striis extus obsolescentibus, punctis sat grossis, intervallicis vix convexis, plicatulis, laeve punctatis, apice leviter sinuato-truncatis, angulo externo vix prominulo; subtus cupraria, purpurino tincta, epipleuris obscure purpureis, pectore lateribus grosse punctato, medio polito et nitidiore, prosterno inter coxas fortiter bistriato, metasterno medio fortiter sulcato, abdomine rugosulo, laeve punctato, segmento ventrali ultimo apice laeviore, tarsis viridibus, nitidis.*

Madagascar (ma collection).

Cette espèce n'a rien qui rappelle les beaux *Polybothris* de la même contrée; elle a le faciès d'un petit *Perotis* et n'est remarquable que par la bande déprimée et pileuse qui longe le bord externe des élytres, ce qui la rapproche de *circundata*, mais le corps est bien plus étroit, le corselet et la tête n'ont pas d'impressions pileuses.

Acmaeodera externa n. sp. — Long. 5 mill. — *Oblonga, subcylindrica, fusca, levissime metallescens, sat nitida, setulis pallidis brevibus parum dense vestita, elytris maculis minutis flavis, praesertim extus ornatis, nervulis 2 externis latius maculatis, disco post medium utrinque puncto oblongo flavo notato; capite dense punctato-ruguloso, clypeo an-*

lice emarginato, bilobato; prothorace transverso, antice a medio rotundato-angustato, dense ruguloso-punctato, medio obsolete sulcatulo, postice utrinque obsolete impresso, angulis rectis: elytris basi subtiliter marginatis, apice tantum angustatis sat subtiliter punctulato-striatulis, striis apice profundioribus, intervallis planiusculis, ruguloso-punctulatis (maculis flavis laevibus), intervallis 2 externis convexis et suturali apice magis elevatis, margine externo postice acute subtiliter serrulato; subtus dense punctato, albido-setosulo, pectore magis rugoso.

Suberbieville (*H. Perrier*).

Cet insecte ressemble à quelques espèces méditerranéennes, et est assez remarquable par ses taches jaunes placées sur la partie externe des élytres, parfois confluentes.

Acmaeodera pruinosa n. sp. — Long. 7 mill. — *Oblong-elongata, apice acuminata, fusca, cage metallescens, modice nitida, squamulis minutis albis parum dense vestita, elytris maculis flavotestaceis minutis sparsutis, 1^a punctiformi, post humerum, 2^a externa, ante medium, obliqua, vittiformi, a medio ad marginem maculis plurimis minutis et macula discoidali post medium; capite subtiliter dense punctato-rugosulo, clypeo medio paulo angulato, antennis fuscis, brevibus; prothorace transverso, lateribus rotundato, antice angustato, margine antico cum angulis rotundato et medio fere producto, dorso dense punctato et lateribus rugosulo, basi utrinque sat fortiter impressa, postice recta, subtiliter marginata; elytris postice acuminatis, dorso ad humeros tuberosis, substriato-punctatis, striis apice profundioribus, intervallis planis, punctato-rugosulis, basi magis rugosis, sutura ad scutellum depressa, margine externo apice subtiliter crenulato, parte externa rugatula; subtus magis fusca, albosetulosa.*

Suberbieville (*H. Perrier*).

Ressemble un peu à *Fatomosparsa* Fairm. mais un peu plus grande, plus acuminée en arrière, plus parallèle, à corselet très arrondi sur les côtés, avec les élytres moins fortement striées, à taches jaunes très clairsemées et à squamules blanches très fines, se rapproche davantage de la *sparsuta* Fairm. à raison de la vestiture et de la forme du corselet, s'en éloigne par le corselet plus rétréci en avant, assez fortement sillonné au milieu et le chaperon biimpressionné en avant. Les fascies jaunâtres des élytres sont parfois presque cachées par les squamules blanchâtres, et leur extrémité est roussâtre.

Entomogaster n. g. — Ce genre, indiqué par La Ferté dans sa

collection, n'a pas été publié; il avait pour type l'*Anthaxia serpunctata* C. G. qui, à en juger par la figure, n'avait guère de rapport avec les *Anthaxia*. Je ne la connais pas en nature, mais mon collègue et ami M. Kerremans m'a communiqué un insecte qui se placerait à côté, et en même temps je recevais, de M. l'abbé David, un autre insecte du même groupe. Ce nouveau genre se rapproche des *Cisséis* et des *Ethon* australiens; il diffère de ces derniers par la tête non profondément excavée ni sillonnée, le corselet non incliné en avant, à lobe médian basal à peine indiqué, l'écusson également triangulaire et acuminé mais petit, les élytres presque parallèles et les crochets tarsiens appendiculés. Il diffère des *Cisséis* par l'écusson non transversal et les 3 premiers articles des antennes courts, subégaux. Le corselet est à peine plus large que long, et les carènes latérales sont longues, l'externe tranchante et entière. Le prosternum est tronqué en avant, obtusément angulé en arrière et reçu dans une échancrure du mésosternum.

E. Kerremansi n. sp. — Long. 7 mill. — *Oblongo-elongatus, subparallelus, modice convexus, coeruleus, sat nitidus, sericeomicans, guttis niveis ornatus, prothorace utrinque uniguttato, elytris utrinque triguttatis, gutta 1^a basali, 2^a ante, 3^a post medium, hac minore, interdum deficiente, coris posticis extus late niveis, abdomine extus bimaculato et intus punctulis minutissimis, maculis prothoracis anterioribus interdum deficientibus: capite densissime subtiliter granuloso, medio late leviter depresso, antice fere truncato, antennis aeneis, prothoracis marginem anticum parum superantibus; prothorace longitudine vix latiore, lateribus vix arcuatis, basi sat fortiter angustato, dorso convexo, dense subtiliter punctato-granulato, basi utrinque sinuato, angulis obtusis: scutello triangulari, acuto, fere laevi; elytris oblongis, postice leviter ampliatis, ante apicem angustatis, apice rotundatis, dorso subtilissime granuloso-punctatis et transversim plicatulis, basi sat fortiter impressis, sutura postice paulo elevata; subtus similiter sculpturatus.*

Fort Dauphin (Blucheu).

Ressemble assez à la figure de l'*E. serpunctatus* C. G. (*Anthaxia*), mais un peu plus grand, d'un beau bleu, les taches des élytres semblablement disposées, mais le corselet est presque aussi long que large, à peine arrondi sur les côtés, et la sculpture de tout le corps est extrêmement fine et serrée, remarquable par les fines lignes qui séparent les rangées de points.

E. modestus n. sp. — Long. 6 mill. — *Oblongus, fusco-coeru-*

lescens, fere velutinus, prothorace vage cupreolo tincto, elytris fasciatis, fasciis baseos leviter cupreolis, posticis griseo-coerulescentibus, valde dilaceratis; capite dense subtiliter rugosulo-punctato, fronte antice transversim carinata, ad oculos utrinque fovea albido-pubescente signata, carina albido-pubescente medio interrupta et vitta simili albida prolongata, antennis crassiusculis, obscuris; prothorace transverso, antice dilatato, basi elytris angustiore, dorso inaequali, basi late triimpresso et transversim depresso, antice utrinque transversim leviter impresso, margine postico trisinuato, utrinque anguste polito, cupreo-micante, carinula interna brevi; elytris oblongis, post medium leviter ampliatis, apice rotundatis, haud denticulatis, dense subtiliter coriaceo-punctulatis, basi et ante medium impressiusculis, margine basali anguste elevata et polita; subtus dense albido-pubescentis.

Madagascar (collection Kerremans).

La coloration de cet insecte, assez mal conservé du reste, ressemble à celle des *Corabus* à fascies ondulées et diffère notablement, sous ce rapport, des autres *Entomogaster* dont il présente les caractères.

Il faut ajouter à ces espèces, d'après l'avis de l'auteur, l'*Agrilus octoguttatus* Kerrem. (Ann. Soc. ent. Belg., 1894, 353), de Diego-Suarez. — Il a 3 1/2 à 4 mill. de longueur, il est allongé, subparallèle, d'un noir brillant, avec des reflets d'un violacé cuivreux sur les bords du corselet et des fémurs et 3 petites taches rondes d'un blanc pur sur chaque élytre, les côtés du corselet de même couleur; le dessous d'un noir brillant avec des taches d'un blanc pur sur le métasternum et sur les côtés du 3^e segment abdominal. — Diego-Suarez.

Discoderes nigrovirens n. sp. — Long. 8 mill. — *Elongatus*, subparallelus, postice leviter ampliatus, supra planiusculus, obscure coerulescentivirescens, plagulis nigris intermixtus, fronte summa medio sulcata et utrinque valde orato-tuberosa, tuberculis nigris, ad oculos utrinque plagula minuta rotunda nitida signata, clypeo antice medio punctato-clerato signato; prothorace transverso, lateribus fere rectis, ante angulos tantum rotundatis, dorso subtiliter et fere transversim rugosulo, inaequali, basi quadriimpresso, disco antice foveolato, plicatulo, extus antice utrinque angulatim plicato; scutello minuto, sat acuto, fere laevi; elytris prothorace haud latioribus, ad humeros sat angulatis, dein levissime angustatis et ante apicem paulo dilatatis, apice truncatulis, extus et intus rotundatis, dorso dense subtiliter punctulato-ceraceis, sutura paulo elevata, apice breviter dehiscente, disco paulo inaequali et utrinque costula media a medio oblitterata signato, parte reflexa

maculis nigris alternata, subtus similiter colorata, setulis albidis sat dense vestita.

Suberbieville (*H. Perrier*).

La forme et la coloration sombre de cette espèce la rendent facile à reconnaître. Elle ressemble au *saxosicollis* Fairm., mais elle est plus grande, plus allongée, plus parallèle, le sommet de la tête présente d'énormes tubercules tandis que le corselet est bien moins inégal, les élytres sont plus longues, tronquées à l'extrémité, mais leur sculpture est analogue.

Sponsor fulgens n. sp. — Long. 4 mill. — *Oblongus, elytris a basi postice attenuatis, viridi-metallicus, valde nitidus, prothorace aureo-micans, elytris aureo- et coeruleo-tinctis: capite convexiusculo, sat dense punctulato, antice verticali, clypeo rugosulo, prothorace transverso, antice angustato, lateribus vir arcuatis, margine externo subtilissime crenulato, auroso, dorso dense subtiliter punctulato, basi asperulo et fortius punctato, basi subtiliter marginata et utrinque punctato grosso signata, angulis anticis valde deflexis; scutello minutissimo, punctato: elytris basi prothorace haud latioribus, a basi postice attenuatis, apice separatim rotundatis, dorso lineato-punctatis, punctis extus confusis et densioribus, basi minus impressis, sutura elevata, obscura, stria suturali postice profunda; subtus fere laevis.*

Ile Maurice (donné par M. Chabanaud).

Se distingue par la forme des élytres qui se rétrécissent peu à peu dès la base à peu près comme chez les *S. pinguis* et *coerulescens*, mais d'une manière plus nette; outre la coloration le corselet est plus court, plus droit sur les côtés, et les élytres sont plus distinctement ponctuées en lignes, au moins vers la suture.

II. — CÉRAMBYCIDES

Paralocus annulicornis n. sp. — Long. 94 2 mill. — Forme du *semitibialis* Fairm., de Diego-Suarez, mais bien plus petit, plus étroit, plus parallèle, d'un fauve roussâtre assez brillant, devenant plus clair vers l'extrémité des élytres et plus foncé sur la tête et le corselet avec des taches de pubescence blanche très fine sur ces derniers ainsi que sur les élytres; tête très finement et densément ponctuée, sillonnée entre les yeux, dénudée et roussâtre en avant, mandibules noires à l'extrémité, antennes très fines, un peu plus longues que le corps. d'une forme pâle, les 2 premiers articles d'un brun rougeâtre, les

suyvants terminés par une tache brune qui s'atténue et finit par s'effacer dans les derniers; corselet à peine plus long que large, à côtés parallèles, presque droits, faiblement sinués à la base, au milieu une fine carène s'élargissant en arrière et formant un relief médiocrement saillant, dénudé, impressionné en arrière, avec un très petit pli de chaque côté et 4 ou 5 fossettes rondes en dehors; écusson brun, ponctué, brillant, presque tronqué; élytres allongées, parallèles, arrondies séparément à l'extrémité, ponctuées assez fortement à la base qui est déprimée, mais ensuite plus faiblement et plus densément, une faible côte partant de l'épaule et se perdant en arrière; dessous brun, brillant, finement pubescent, rougeâtre au milieu, fémurs d'un brun rougeâtre, plus clair à la base, avec un anneau pâle avant l'extrémité, tarsi et grande moitié basilaire des tibiai d'un jaune pâle.

Vallée de la Betsiboka (*H. Perrier*).

Paralocus scutatus n. sp. — Long. 40 mill. — Ressemble beaucoup au précédent; tête et corselet plus foncés, la première plus fortement sillonnée, non dénudée ni rougeâtre en avant, antennes plus longues, entièrement d'un brun de poix, 1^{er} article un peu ponctué; corselet plus court, plus arrondi sur les côtés, plus finement ponctué avec quelques rares gros points, ayant aussi un petit relief oblong au milieu de la base, mais non prolongé en avant, et quelques taches en fossettes brunes sur les côtés; écusson presque tronqué, d'un brun noir, sillonné, élytres à base non déprimée, moins fortement ponctuée; dessous et pattes bruns, couverts d'une épaisse pubescence cendrée parsemée de points dénudés.

Vallée de la Betsiboka (*H. Perrier*).

Le genre *Teinotus* Brancs. (*Soc. Hist. Nat. Trensén*, vol. XIX-XX, p. 427) dont le type, *T. cinereus*, est figuré pl. IV, n° 20, me paraît identique au genre *Paralocus*, à en juger par la figure qui accompagne la description et avec l'espèce que j'ai décrite sous le nom de *semitibialis*. Cependant mon insecte paraît plus long, surtout pour le corselet qui, de plus, n'est pas *subcoarctatus* en avant, et présente au milieu 2 tubercules, non une élévation transversale obsolète; il est garni de gros points très écartés, dénudés, et on ne peut dire qu'il soit : *nigro rufè punctato*. C'est la coloration des tibiai qui me fait croire à l'identité des deux insectes dont les descriptions ont paru presque en même temps.

Leptocera aeneola n. sp. — Long. 11 mill. — Ressemble extrêmement à *L. (Glaucoptes) metallica* Fairm. (*Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, C. R.,

381), pour la taille et la coloration; mais le corps est glabre, d'un brun foncé, médiocrement brillant sur la tête et le corselet, le dessous brillant avec le milieu du prosternum et le mésosternum rougeâtres ainsi que le front; la tête est rugueusement ponctuée sur le sommet, non impressionnée entre les antennes, la face est lisse, verticale, le 3^e article des antennes est presque trois fois aussi long que le 4^e, le corselet est densément et également ponctué, non plissé en travers, les flancs sont bordés inférieurement d'une ligne blanche très fine; l'écusson est brun, lisse, presque tronqué; les élytres sont d'un bleu un peu verdâtre, métallique, devenant un peu cuivreux-doré à la base, la ponctuation est assez forte, serrée, irrégulière, un peu en lignes à la base, finement ridulée, à peine plus fine vers l'extrémité qui est nettement tronquée, nullement rougeâtre, la suture n'a pas de ligne argentée; les pattes sont d'un rougeâtre obscur avec les fémurs très claviformes.

Vallée de la Betsiboka (H. Perrier).

Leptocera coeruleata n. sp. — Long. 7 mill. — *Paulo elongata, prothorace convexo, elytris planiusculis, coerulescens, parum nitida, paulo sericans, antennis rufis, articulis 3 primis piceis: capite laevi, inter oculos transversim et longitudinaliter sulcatulo, antennis gracilibus, articulo 1^o sat clarato, 3^o et 4^o ceteris brevioribus et inter se aequalibus: prothorace oblongo, latitudine fere duplo longiore, elytris angustiore, antice et postice fere aequaliter angustato, antice levissime constricto, medio leviter ampliato, dorso laevi, basi transversim impresso; scutello ovato, fusco, apice rotundato; elytris parallelis, ad humeros angulatis, apice rotundato-subtruncatis, dorso dense sat fortiter punctatis, punctis apice paulo minoribus, sutura tenuiter elevata: subtus fusco-coerulescens, pedibus rufescentibus, gracilibus, femoribus paulo infuscatis, valde clavatis.*

Vallée de la Betsiboka (H. Perrier).

Cet insecte diffère assez des vraies *Leptocera* par ses élytres déprimées, les pattes et antennes grêles, ces dernières ayant les 3^e et 4^e articles égaux, plus courts que les 5^e et suivants. Sa sculpture est très fine et sa coloration très spéciale.

Nethinius Fairm., Ann. Soc. ent. Belg., 1889. C. R., 94.

Ayant constaté l'identité de ce genre avec le g. *Noemia* Pasc., j'ai proposé le changement du nom que j'avais donné. Mais je viens de constater qu'il y a déjà le nom de *Noemia* créé en 1851 par Mulsant pour un genre de Coccinellide tandis que le nom de Pascoe date de 1857.

Il faudra donc reprendre le nom de *Nethinius* non seulement pour les espèces de Madagascar, mais aussi pour celles de l'Asie orientale.

Eumimetes Perrieri n. sp. — Long. 14 à 20 mill. — *Oblongus, concavus, postice leviter attenuatus, nigro-fuscus, indumento pubescente griseo-cinereo dense vestitus, capite summo, prothorace et elytrorum basi fusco reticulatis, his macula minuta humerali nigro-velutina, utrinque macula subbasali et macula minuta discoidali nigro-penicillatis, antennis fuscis, dense subtiliter cinereo-pubescentibus; capite medio subtiliter striato; prothorace utrinque fortiter angulato, dorso haud transversim sulcatulo; scutello medio fusco-vittato; elytris uniformiter griseocinereis, parte basali, prothorace sola fusco reticulata: subtus cum pedibus similiter vestitus, pectore fusco-maculato, abdomine punctulis fuscis sparsuto.*

Vallée de la Betsiboka (*H. Perrier*).

Ce joli insecte a été trouvé en compagnie de l'*E. bioculatus* Fairm., auquel il ressemble beaucoup; il en diffère par le dessus de la tête, le corselet et la base des élytres couverts d'un réseau brun serré, ces dernières, sauf la base, sont d'un gris de souris uniforme, avec une tache noire aux épaules, une petite tache fasciculée après la base et une autre petite au milieu en arrière; le corselet n'a pas de stries transversales.

Madecops convexicollis n. sp. — Long. 13 mill. — Ressemble extrêmement à *M. denticollis* Fairm., de Bourbon, mais un peu plus grand, plus large, d'un brunâtre couvert d'une fine pubescence gris de souris avec des fascies vaguement enfumées à la base, au milieu et à l'extrémité, la tête est bien plus convexe en avant, marquée de petits points bruns écartés, les antennes sont plus longues, dépassant un peu l'extrémité des élytres, les articles dénudés et rembrunis à l'extrémité à partir du 3^e, le 1^{er} moins court et plus cylindrique; le corselet est parsemé de petits points bruns écartés, avec 3 lignes d'un gris plus clair, peu distinctes, et une bande basilaire brune biangulée en avant; l'écusson est presque tronqué, d'un brun foncé entouré de gris, les intervalles sont alternativement et faiblement relevés, marqués de points bruns avec quelques petites taches grisâtres, la suture également; le dessous et les pattes sont uniformément de la même couleur grise, parsemée de nombreux petits points brunâtres.

Vallée de la Betsiboka (*H. Perrier*).

Praonetha lineigera n. sp. — Long. 9 mill. — Ressemble beau-

coup à la *P. nervosa* Fairm., de Mayotte, mais plus petite, avec les antennes d'un brun assez clair, plus foncé à l'extrémité des articles, le 1^{er} plus cylindrique, moins fusiforme; le corselet présente au milieu une ligne élevée, pâle, bordée de chaque côté par une ligne de gros points espacés, en dehors une bande également pâle, les côtés également pâles avec une très petite dent au milieu; l'écusson est d'un brun foncé; les élytres, très angulées aux épaules, ont la suture élevée, et de chaque côté 2 côtes plus ou moins saillantes, assez épaisses, la 1^{re} atteignant presque l'extrémité, la 2^e presque effacée à la base, un peu moins à l'extrémité et rejoignant plus ou moins la 1^{re}, en dehors une côte plus ou moins marquée, les intervalles un peu concaves, légèrement ponctués; une teinte brunâtre formant un angle obtus, à la base, quelques points bruns sur la suture; les élytres sont d'un roussâtre carné avec quelques macules oblongues brunâtres, leur extrémité est tronquée simplement; le dessous et les pattes ont la même coloration parsemée de taches brunes, le tout plus brillant que le dessus; les fémurs sont plus épais et plus larges.

Vallée de la Betsiboka : Suberbieville (H. Perrier).

Praonetha obliquepicta n. sp. — Long. 8 1 2 mill. — *Elongata, postice vix attenuata, piceola, subtiliter dense pubescens, elytris fascia obliquata ab humeris incipiente et suturam versus oblique ducta ac dilatata, et ante apicem fasciis 2 paulo obliquis dilute pubescenti-cinereis; capite granulis minutis parum dense asperato, antennis corpore haud brevioribus, squalide fulvescentibus, articulis 3 primis piceis, fulco punctatis, ceteris apice piceis; prothorace transverso, subquadrato, elytris angustiore, lateribus fere rectis, utrinque dente minuto armatis, basi et antice transversim impresso, linea media subelevata anguste pallida, lateribus vage pallulis; scutello fusco, lato, truncatulo: elytris ante apicem angustatis, apice oblique truncatis, angulo suturali valde rotundato, externo parum producto, sutura et utrinque lineis 2 tenuiter elevatis, punctis brunneis distantibus ornatis, interstiliis parum dense punctatis, punctulis brunneis sparsutis; subtus cum pedibus picea, maculis numerosis cinereo-pubescentibus variegata.*

Nossi-Bé (ma collection).

Cette espèce est remarquable par les dessins obliques des élytres dont les extrémités sont un peu déhiscentes avec les angles suturaux très effacés.

Rusculus n. g.

Ce nouveau genre, voisin des *Sthenias* et des *Nicarete*, diffère des

premiers par la tête étroite, fortement creusée entre les antennes qui sont rapprochées à la base, et des seconds par les antennes simples, la tête seulement verticale, le corselet à côtés moins droits, les élytres également très angulées aux épaules, mais s'atténuant peu à peu dès la base, couvertes de stries fortement ponctuées avec des côtes assez saillantes et l'extrémité fortement déclive avant la troncature; l'abdomen est beaucoup plus court. Le 1^{er} article des antennes est épais, subcylindrique, tronqué, le 3^e égal au 4^e, les suivants diminuant peu à peu, tous glabres, et atteignant presque l'extrémité des élytres; les pattes sont courtes, assez robustes, les crochets des tarses sont petits, soudés à la base, le pénultième article profondément bilobé et très large.

R. costulatus n. sp. — Long. 9 mill. — *Sat elongatus, convexus, piceus, vir nitidulus, pilis fuliginis variegatus; pilis sat longis fuscis hirsutus, capite dense fuliginoso, piloso, supra antennarum basin dilutiore, fronte concava, oculis sat grosse granulatis, antennis parum gracilibus, fuscis, opacis, articulo 1^o crasso, ruguloso, ceteris basi dilutioribus; prothorace subquadrato, lateribus vir arcuatis, antice et postice aequaliter angustato, dorso sat subtiliter strigoso, medio linea anguste et utrinque late demudato, fusco: scutello cinereo, apice late rotundato: elytris ad humeros angulatis, ab humeris postice leviter attenuatis, basi utrinque et paulo post medium ad latera cinereo-maculosis, declivitate apicali dense ferrugineo-pilosa, dorso grosse punctato-striatis, striis postice vir impressis, intervallis costulatis, basi praesertim, et leviter laeve aspero-punctatis, apice extremo confusis; subtus cum pedibus dense cinereo-pubescentis, his laeve ac longe pilosis, punctis demudatis sparsutis.*

Vallée de la Betsiboka (*H. Perrier*).

Le genre *Crossotiades* Fairm., Ann. Soc. ent. Belg., C. R., 1898, 422, est identique au genre *Nicarete* Thoms.

Hoplonannus n. g.

Ce nouveau genre est très voisin des *Aura* dont il diffère par le corselet qui, au lieu des fortes dents de la partie postérieure et des côtés, n'a que 2 tubercules assez obtus sur le disque et des angles latéraux bien marqués et seulement pointus; les élytres sont atténuées dès la base et finissent en pointe obtuse, leur base est bien plus large que celle du corselet et ne porte, de chaque côté, qu'un très petit tubercule; les antennes sont glabres, grêles, et le 3^e article n'est pas plus long que le 4^e; les pattes sont courtes, les fémurs larges et robustes.

H. attenuatus n. sp. — Long. 3 1 3 mill. — Un peu allongé, atténué en arrière, convexe, brun, peu brillant, corselet un peu rougeâtre en avant, élytres d'un fauve assez pâle, à peine brillant, finement pubescentes, très atténuées à l'extrémité qui se termine en pointe mousse, couvertes d'une ponctuation extrêmement fine et serrée, les 2 reliefs de la base se terminant par une petite pointe noire; en arrière quelques linéoles brunes, une plus large sur les côtés au milieu; le dessus et les pattes sont brunâtres, les segments ventraux à bande apicale rousse, les pattes un peu tachetées.

Vallée de la Betsiboka (*H. Perrier*).

Apomecyna serieguttata n. sp. — Long. 4 à 6 mill. — *Oblongo-elongata, subparallela, convexa, picea, pube grisea dense vestita et pilis fuscis obliquis sat dense hirtula, elytra disco maculis punctiformibus albido-pilosis uniserialim instructis et punctis pilosis albidis variegatis: capite rufescente, vertice grosse punctato, antice laeviore, antennis rufopiceis, crassiusculis, 2/3 corporis attingentibus, subtus leviter ciliatis; prothorace parum transverso, elytris angustiore, lateribus rotundato, antice et postice aequaliter angustato, densissime ruguloso-punctato, pilis griseis maculatim condensatis: scutello dense albido-piloso: elytris sat elongatis, parallelis, apice separatim rotundatis, punctato-striatulis, punctis parum densatis, basi confusis, intercallis vix connexiusculis (5 maculis albidis minutis serialim ornato), postice magis elevatis, striis externis magis impressis; subtus fuscula, apice paulo rufescens, griseo-pubescentibus, pedibus rufotestaceis.*

Subervieville (*H. Perrier*).

Ressemble assez à l'*A. guttulata* Fairm., mais plus parallèle, plus petite, avec les élytres arrondies à l'extrémité et remarquables par la ligne de petites taches blanchâtres espacées sur le 5^e intervalle.

Exocentrus elegans n. sp. — Long. 4 à 5 mill. — *Oblongus, sat convexus, piceo-fuscus, opaculus, dense subtiliter pubescens, prothorace lineis 3 tenuibus, albido-pubescentibus ornato, externis fere obsoletis, scutello, sutura et utrinque lineolis 4 interdum interruptis, paulo elevatis, albido-pubescentibus, dorso basi, post medium et ante apicem, fusco fasciolato, fasciis 2 ultimis persuturam anguste conjunctis; capite subtilissime dense punctulato, plus minusse rufescente, antennis rufopiceis, subtiliter ciliatis, articulo 1^o fusiformi: prothorace parum transverso, elytris valde angustiore, medio paulo ampliato et utrinque spinula brevissima armato, dorso densissime subtiliter punctulato; elytris ad*

humeros angulatis, parallelis, apice obtusis dorso lineato-punctatis, lineis albidis paulo elevatis, interstitio 1^o latiore, irregulariter punctato; subtus fusco-piceus, subtiliter griseo-pubescent, pedibus sat brevibus, validis, rufopiceis, tarsi fuscis.

Vallée de la Betsiboka (*H. Perrier*).

Plus élégamment coloré que ses congénères, dépourvu de poils hérissés, avec des épines prothoraciques très fines et très courtes.

